

定期予防接種の一覧

個別、 集団	予防接種の種類	標準的な接種年齢	公費で接種できる年齢	備考
個	ロタウイルス	ロタリックス：出生6週～出生24週 ロタテック：出生6週～32週	同左	ワクチンの種類により、 接種可能時期、回数が異なります。
個	小児用肺炎球菌	初回：生後2か月～7か月未満 追加：生後12か月～15か月未満	生後2か月～5歳の誕生日の 前々日まで	初回は接種開始月齢により、 接種回数が異なります。
個	DPT-IPV-Hib 五種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ・ヒブ)	初回：生後2か月～12か月未満 追加：初回接種終了後12か月～ 18か月の間隔をおいて接種	生後2か月～7歳6か月になる 前々日まで	初回は接種開始月齢により、 接種回数が異なります。
個	B型肝炎	生後2か月～9か月	1歳の誕生日の前々日まで	
個	BCG	生後5か月～8か月未満	1歳の誕生日の前々日まで	
個	水痘（水ぼうそう）	1回目：生後12か月～15か月未満 2回目：1回目終了後6か月～ 12か月の間隔をおいて接種	1～3歳の誕生日の前々日 まで	
個	MR（麻しん・風しん） 1期	1歳を過ぎたらなるべく早く接種	1歳～2歳の誕生日の前々日 まで	
集	MR（麻しん・風しん） 2期	小学校に上がる前の年度	小学校就学前の1年間	
個 (追加のみ 集団)	日本脳炎 1期	初回1～2回目：3～4歳 追加：4～5歳（初回2回目終了後6 か月～おおそ1年後）	生後6か月～7歳6か月になる 前々日まで	日本小児科学会は、 生後6か月から接種開始を 推奨しています。
個	日本脳炎 2期	9歳～10歳（小学校4年生相当）	9歳～13歳の誕生日の前々日 まで	
個	DT 二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳～12歳未満	11歳～13歳の誕生日の前々日 まで	三種混合ワクチンでの接種 (任意)を受けた場合、二種 混合ワクチン接種分の接種費 用助成制度があります。
個	HPV（子宮頸がん予防）	13歳となる日の属する年度の初日から 末日までの間	小学校6年生～高校1年生に 相当する年齢の女子	キャッチアップ接種について 令和6年度は、平成9年度生 まれから平成19年度生まれま での女子も対象となります。